

## IV.

## РѢШЕНИЕ ОСНОВНЫХЪ УРАВНЕНІЙ

## ТЕОРИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ.

А. П. Грузинцева.

Въ математической теоріи кристаллической поляризации, данной въ первый разъ Ф. Нейманномъ въ 1835 году въ сочиненіи подъ заглавіемъ — «*Ueber den Einfluss der Krystallflächen bei der Reflexion des Lichtes und über die Intensität des gewöhnlichen und ungewöhnlichen Strahls*», основныя уравненія представляютъ систему четырехъ уравненій 1-й степени съ 4-мя неизвѣстными. Уравненія эти настолько сложны, что рѣшеніе ихъ обычнымъ, непосредственнымъ, если можно такъ выразиться, путемъ представляетъ большія трудности, вслѣдствіе сложности вычисленій; хотя Нейманнъ и рѣшилъ сказанныя уравненія, но путемъ крайне утомительныхъ выкладокъ; чтобы дать понятіе о трудности приѣма Нейманна, я позволю себѣ привести здѣсь слова извѣстнаго французскаго физика, Корню. Этотъ послѣдній, излагая приѣмъ Нейманна, говоритъ о немъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «П (M. Neumann) osa attaquer de front les pénibles éliminations de sa théorie et son travail restera un chef-d'œuvre de patience analytique». (Annales de chimie et de physique. 4-ème série, tome XI, p. 299).

Макъ-Куллохъ, занимавшійся тѣмъ-же вопросомъ, предложилъ особый способъ для рѣшенія разбираемыхъ уравненій; приѣмъ его въ высшей степени искусственный, хотя и проще способа Ней-

манна, но все-таки представляет неудобства, когда приходится находить окончательныя рѣшенія вопроса; за-то онъ очень удобенъ для общаго изслѣдованія окончательныхъ результатовъ, — каковымъ качествомъ не обладаетъ приемъ Нейманна.

Въ настоящей замѣткѣ будетъ изложенъ новый приемъ для рѣшенія основныхъ уравненій теории кристаллической поляризаціи — приемъ, не имѣющій, какъ мнѣ кажется, тѣхъ недостатковъ, кои присущи упомянутымъ выше приемамъ Нейманна и Макъ-Куллоха; излагаемый здѣсь приемъ мнѣ кажется полезнымъ еще потому, что другіе авторы<sup>1</sup>, занимавшіеся тѣмъ-же вопросомъ, довольствовались лишь выводомъ основныхъ уравненій, не приводя ихъ рѣшенія, — по всей вѣроятности въ силу сложности вычисленій.

### § 1.

Основные уравненія теории кристаллической поляризаціи мы возьмемъ въ слѣдующей формѣ:

$$(a) \quad (\sin \theta - h \sin \theta') \cos i = \left( \frac{g_1 \sin \theta_1 \cos \sigma_1}{\sin \sigma_1} + \frac{g_2 \sin \theta_2 \cos \sigma_2}{\sin \sigma_2} \right) \sin i$$

$$\sin \theta + h \sin \theta' = g_1 \sin \theta_1 + g_2 \sin \theta_2$$

$$(d) \quad \cos \theta + h \cos \theta' = \left( \frac{g_1 \cos \theta_1}{\sin \sigma_1} + \frac{g_2 \cos \theta_2}{\sin \sigma_2} \right) \sin i$$

$$(e) \quad (\cos \theta - h \cos \theta') \cos i = g_1 \cos \sigma_1 (\cos \theta_1 + \operatorname{tang} u_1 \operatorname{tg} \sigma_1) + \\ + g_2 \cos \sigma_2 (\cos \theta_2 + \operatorname{tang} u_2 \operatorname{tg} \sigma_2).$$

Въ этихъ уравненіяхъ буквы имѣютъ слѣдующія значенія:

$h, g_1, g_2$  амплитуды колебаній отраженнаго и обоихъ преломленныхъ лучей, принимая амплитуду падающаго = 1;  
 $\theta, \theta', \theta_1, \theta_2$  азимуты плоскостей поляризаціи падающаго, отраженнаго и обоихъ преломленныхъ лучей;

<sup>1</sup> Кирхгофъ и Кеттелеръ.

$i$             уголъ паденія луча;  
 $\sigma_1, \sigma_2$     углы преломленія и  
 $u_1, u_2$     углы между преломленными лучами и нормалами со-  
 отвѣтствующихъ плоскихъ волнь.

Замѣтимъ, что здѣсь предполагается перпендикулярность плоскостей поляризаціи ( $\theta, \theta', \theta_1$  и  $\theta_2$ ) къ тѣмъ, кои входятъ въ теоріи Нейманна.

Въ написанныхъ уравненіяхъ неизвѣстныя суть:  
 $h, g_1, g_2$  и  $\theta'$ ,  
 остальные количества суть данныя.

### § 2.

Разсмотримъ сначала случай, когда падающій лучъ поляризованъ въ такъ-называемомъ первомъ азимутѣ. Введемъ *четыре вспомогательныя количества*:

$$g, \varphi, \sigma \text{ и } u,$$

полагая сначала:

$$(\sin \theta - h \sin \theta') \cos i = \frac{g \sin \varphi \cos \sigma \sin i}{\sin \sigma} \quad (a)$$

$$\sin \theta + h \sin \theta' = g \sin \varphi \quad (b)$$

а за-тѣмъ будемъ имѣть:

$$\frac{g \sin \varphi \cos \sigma}{\sin \sigma} = \frac{g_1 \sin \theta_1 \cos \sigma_1}{\sin \sigma_1} + \frac{g_2 \sin \theta_2 \cos \sigma_2}{\sin \sigma_2} \quad (\alpha)$$

$$g \sin \varphi = g_1 \sin \theta_1 + g_2 \sin \theta_2. \quad (\beta)$$

Изъ уравненій (a) и (b) находимъ:

$$h \sin \theta' = - \frac{\sin(i - \sigma)}{\sin(i + \sigma)} \sin \theta \quad (I)$$

$$g \sin \varphi = \frac{2 \cos i \sin \sigma}{\sin(i + \sigma)} \sin \theta. \quad (I)$$

§ 3.

Для случая, когда падающій лучъ поляризованъ во второмъ азимутѣ, полагаемъ:

$$\cos \theta + h \cos \theta' = \frac{g \cos \varphi \sin i}{\sin \sigma} \quad (c)$$

$$(\cos \theta - h \cos \theta') \cos i = g \cos \sigma (\cos \varphi + \operatorname{tang} u \operatorname{tang} \sigma). \quad (d)$$

Кромѣ того будемъ имѣть:

$$\frac{g \cos \varphi}{\sin \sigma} = \frac{g_1 \cos \theta_1}{\sin \sigma_1} + \frac{g_2 \cos \theta_2}{\sin \sigma_2} \quad (\gamma)$$

$$g \cos \sigma (\cos \varphi + \operatorname{tang} u \operatorname{tang} \sigma) = g_1 \cos \sigma_1 (\cos \theta_1 + \operatorname{tang} u_1 \operatorname{tang} \sigma_1) + g_2 \cos \sigma_2 (\cos \theta_2 + \operatorname{tang} u_2 \operatorname{tang} \sigma_2). \quad (d)$$

Понятно, что здѣсь величины  $g$ ,  $\varphi$ ,  $\sigma$  и  $u$  тѣ-же, что и въ предыдущемъ параграфѣ.

Уравненія (c) и (d) даютъ:

$$h \cos \theta = \frac{\sin(i - \sigma) \cos(i + \sigma) \cos \varphi - \sin^2 \sigma \operatorname{tang} u}{\sin(i + \sigma) \cos(i - \sigma) \cos \varphi + \sin^2 \sigma \operatorname{tang} u} \cos \theta,$$

$$g = \frac{2 \cos i \sin \sigma \cos \theta}{\sin(i + \sigma) \cos(i - \sigma) \cos \varphi + \sin^2 \sigma \operatorname{tang} u}.$$

Если для симметріи и удобства вычисленій положимъ:

$$\operatorname{tang} u = \cos \varphi \operatorname{tang} \tau,$$

причемъ  $\tau$  будетъ вспомогательное переменное, замѣняющее прежнее  $u$ , то двѣ послѣднія формулы обратятся въ слѣдующія:

$$h \cos \theta' = \frac{\sin(i - \sigma) \cos(i + \sigma) - \sin^2 \sigma \operatorname{tang} \tau}{\sin(i + \sigma) \cos(i - \sigma) + \sin^2 \sigma \operatorname{tang} \tau} \cos \theta. \quad (II)$$

$$g \cos \varphi = \frac{2 \cos i \sin \sigma \cos \theta}{\sin(i + \sigma) \cos(i - \sigma) + \sin^2 \sigma \operatorname{tang} \tau}. \quad (2)$$

Итакъ знаемъ:

$$h \sin \theta' = \text{функ.} (\sigma) \quad , \quad h \cos \theta' = \text{функ.} (\sigma, \tau)$$

$$g \sin \varphi = \text{функ.} (\sigma) \quad , \quad g \cos \varphi = \text{функ.} (\sigma, \tau).$$

§ 4.

Обратимся теперь къ преломленнымъ лучамъ.

Уравнения  $(\alpha)$  и  $(\beta)$  § 2 даютъ:

$$g_1 \sin \theta_1 = \frac{\sin(\sigma - \sigma_2) \sin \sigma_1}{\sin(\sigma_1 - \sigma_2) \sin \sigma} g \sin \varphi,$$

$$g_2 \sin \theta_2 = \frac{\sin(\sigma - \sigma_1) \sin \sigma_2}{\sin(\sigma_1 - \sigma_2) \sin \sigma} g \sin \varphi;$$

подставляя сюда значеніе  $g \sin \varphi$  изъ равенства (1), получимъ:

$$g_1 \sin \theta_1 = \frac{2 \sin(\sigma - \sigma_2) \sin \sigma_1 \cos i}{\sin(i + \sigma) \sin(\sigma_1 - \sigma_2)} \sin \theta. \quad (\text{III})$$

$$g_2 \sin \theta_2 = - \frac{2 \sin(\sigma - \sigma_1) \sin \sigma_2 \cos i}{\sin(i + \sigma) \sin(\sigma_1 - \sigma_2)} \sin \theta. \quad (\text{IV})$$

Итакъ знаемъ:

$$g_1 \sin \theta_1 = \text{функ.} (\sigma), \quad g_2 \sin \theta_2 = \text{функ.} (\sigma).$$

§ 5.

Разрѣшимъ теперь уравненія  $(\gamma)$  и  $(\delta)$ , полагая предварительно для симметріи и удобства вычисленія:

$$\text{tang } u_1 = \cos \theta_1 \text{ tang } \tau_1, \quad \text{tang } u_2 = \cos \theta_2 \text{ tang } \tau_2,$$

причемъ  $\tau_1$  и  $\tau_2$ , подобно  $\tau$ , будутъ играть роль угловъ  $u$  и  $u_2$ ; они имѣютъ простое и очевидное геометрическое значеніе.

Послѣ легкихъ преобразованій, найдемъ:

$$g_1 \cos \theta_1 = \left\{ \begin{array}{l} [\sin(\sigma - \sigma_2) \cos(\sigma + \sigma_2) + \sin^2 \sigma \text{ tang } \tau - \\ - \sin^2 \sigma_2 \text{ tang } \tau_2] \sin \sigma_1 \\ \sin(\sigma_1 - \sigma_2) \cos(\sigma_1 + \sigma_2) + \sin^2 \sigma_1 \text{ tang } \tau_1 - \\ - \sin^2 \sigma_2 \text{ tang } \tau_2] \sin \sigma \end{array} \right\} g \cos \varphi,$$

$$g_2 \cos \theta_2 = - \frac{\left\{ \begin{array}{l} [\sin(\sigma - \sigma_1) \cos(\sigma + \sigma_1) + \sin^2 \sigma \operatorname{tang} \tau - \\ - \sin^2 \sigma_1 \operatorname{tang} \tau_1] \sin \sigma_2 \\ [\sin(\sigma_1 - \sigma_2) \cos(\sigma_1 + \sigma_2) + \sin^2 \sigma_1 \operatorname{tang} \tau_1 - \\ - \sin^2 \sigma_2 \operatorname{tang} \tau_2] \sin \sigma \end{array} \right\}}{g \cos \Phi}.$$

Подставляя сюда значение  $g \cos \Phi$  изъ равенства (2), найдемъ:

$$g_1 \cos \theta_1 = \frac{\left\{ \begin{array}{l} 2[\sin(\sigma - \sigma_2) \cos(\sigma + \sigma_2) + \sin^2 \sigma \operatorname{tang} \tau - \sin^2 \sigma_2 \operatorname{tang} \tau_2] \\ \sin \sigma_1 \cos i \cos \theta \end{array} \right\}}{\left\{ \begin{array}{l} [\sin(\sigma_1 - \sigma_2) \cos(\sigma_1 + \sigma_2) + \sin^2 \sigma_1 \operatorname{tang} \tau_1 - \sin^2 \sigma_2 \operatorname{tang} \tau_2] \\ [\sin(i + \sigma) \cos(i - \sigma) + \sin^2 \sigma \operatorname{tang} \tau] \end{array} \right\}}. \quad (\text{V})$$

$$g_2 \cos \theta_2 = - \frac{\left\{ \begin{array}{l} 2[\sin(\sigma - \sigma_1) \cos(\sigma + \sigma_1) + \sin^2 \sigma \operatorname{tang} \tau - \sin^2 \sigma_1 \operatorname{tang} \tau_1] \\ \sin \sigma_2 \cos i \cos \theta \end{array} \right\}}{\left\{ \begin{array}{l} [\sin(\sigma_1 - \sigma_2) \cos(\sigma_1 + \sigma_2) + \sin^2 \sigma_1 \operatorname{tang} \tau_1 - \sin^2 \sigma_2 \operatorname{tang} \tau_2] \\ [\sin(i + \sigma) \cos(i - \sigma) + \sin^2 \sigma \operatorname{tang} \tau] \end{array} \right\}}. \quad (\text{VI})$$

Итакъ знаемъ:

$$g_1 \cos \theta_1 = \text{функ. } (\sigma, \tau) \text{ и } g_2 \cos \theta_2 = \text{функ. } (\sigma, \tau).$$

### § 6.

Раздѣляя (III) и (IV\*) соотвѣтственно на (V) и (VI), найдемъ два уравненія:

$$\operatorname{tang} \theta_1 = \text{функц. } (\sigma, \tau) \text{ и } \operatorname{tang} \theta_2 = \text{функц. } (\sigma, \tau).$$

Изъ этихъ уравненій найдемъ  $\sigma$  и  $\tau$  въ функціи данныхъ и извѣстныхъ:  $i$ ,  $\theta$ ,  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ ,  $\theta_1$ ,  $\theta_2$ ,  $\tau_1$  и  $\tau_2$ ; первыя два количества суть непосредственно данныя, а остальные находятся по извѣстнымъ законамъ двойнаго преломленія.

Зная  $\sigma$  и  $\tau$ , опредѣлимъ  $h \sin \theta'$ ,  $h \cos \theta'$ ,  $g_1$  и  $g_2$  въ функціи данныхъ и извѣстныхъ, т. е. рѣшимъ предложенную себѣ задачу окончательно; можно опредѣлить также  $g \sin \Phi$  и  $g \cos \Phi$ , т. е.  $g$  и  $\Phi$  по уравненіямъ (1) и (2).

<sup>1</sup> Зная  $h \sin \theta'$  и  $h \cos \theta'$ , мы опредѣлимъ  $h$  и  $\theta'$ .

§ 7.

Займемся развитіемъ соѣчасъ сказаннаго. Раздѣливъ  $\text{tang } \theta_1$  и  $\text{tang } \theta_2$  на  $\text{tang } \theta$ , имѣемъ:

$$\frac{\text{tang } \theta_1}{\text{tang } \theta} = \frac{\sin(\sigma - \sigma_2) \{ \sin(i + \sigma) \cos(i - \sigma) + \sin^2 \sigma \text{tang } \tau \} \{ \sin(\sigma_1 - \sigma_2) \}}{\cos(\sigma_1 + \sigma_2) + \sin^2 \sigma_1 \text{tang } \tau_1 - \sin^2 \sigma_2 \text{tang } \tau_2}$$

$$\frac{\text{tang } \theta_2}{\text{tang } \theta} = \frac{\sin(\sigma - \sigma_1) \{ \sin(i + \sigma) \cos(i - \sigma) + \sin^2 \sigma \text{tang } \tau \} \{ \sin^2(\sigma - \sigma_2) \}}{\cos(\sigma_1 + \sigma_2) + \sin^2 \sigma_1 \text{tang } \tau_1 - \sin^2 \sigma_2 \text{tang } \tau_2}$$

Раздѣляя одно уравненіе на другое и сокращая, найдемъ:

$$\frac{\text{tang } \theta_1}{\text{tang } \theta_2} = \frac{\sin(\sigma - \sigma_2) \{ \sin(\sigma - \sigma_1) \cos(\sigma + \sigma_1) + \sin^2 \sigma \text{tang } \tau - \sin^2 \sigma_1 \text{tang } \tau_1 \}}{\sin(\sigma - \sigma_1) \{ \sin(\sigma - \sigma_2) \cos(\sigma + \sigma_2) + \sin^2 \sigma \text{tang } \tau - \sin^2 \sigma_2 \text{tang } \tau_2 \}} \quad (\text{A})$$

Положимъ:

$$\sin(\sigma - \sigma_1) \cos(\sigma + \sigma_1) - \sin^2 \sigma_1 \text{tang } \tau_1 = \lambda_1 \sin^2 \sigma$$

$$\sin(\sigma - \sigma_2) \cos(\sigma + \sigma_2) - \sin^2 \sigma_2 \text{tang } \tau_2 = \lambda_2 \sin^2 \sigma.$$

и

$$\frac{\text{tang } \theta_1 \sin(\sigma - \sigma_1)}{\text{tang } \theta_2 \sin(\sigma - \sigma_2)} = m,$$

тогда равенство (A) превратится въ слѣдующее:

$$m = \frac{\lambda_1 + \text{tang } \tau}{\lambda_2 + \text{tang } \tau};$$

откуда:

$$\text{tang } \tau = \frac{\lambda_1 - m \lambda_2}{m - 1}. \quad (\text{B})$$

Положимъ на-время:

$$\begin{aligned} \sin(\sigma_1 - \sigma_2) \cos(\sigma_1 + \sigma_2) + \sin^2 \sigma_1 \operatorname{tang} \tau_1 - \sin^2 \sigma_2 \operatorname{tang} \tau_2 &= \alpha \\ \sin \sigma_1 \cos \sigma_1 + \sin^2 \sigma_1 \operatorname{tang} \tau_1 - m \{ \sin \sigma_2 \cos \sigma_2 + \sin^2 \sigma_2 \operatorname{tang} \tau_2 \} &= \beta \\ \operatorname{tang} \theta_1 &= n_1 \operatorname{tang} \theta, \operatorname{tang} \theta_2 = n_2 \operatorname{tang} \theta. \end{aligned}$$

Подставляя значеніе  $\operatorname{tang} \tau$  изъ равенства (B) въ уравненіе для  $\operatorname{tang} \theta_1$ , найдемъ:

$$\begin{aligned} n_1 \sin(i + \sigma) \sin(\sigma_1 - \sigma_2) - \beta \sin(\sigma - \sigma_2) + \\ + (m - 1) \sin i \cos i \sin(\sigma - \sigma_2) &= 0. \end{aligned} \quad (C)$$

замѣтивъ предварительно, что

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \sin^2 \sigma = -\alpha,$$

$$(m \lambda_2 - \lambda_1) \sin^2 \sigma = (m - 1) \sin \sigma \cos \sigma + \beta.$$

Если-бы пользовались уравненіемъ для  $\operatorname{tang} \theta_2$ , то нашли бы:

$$\begin{aligned} n_2 \sin(i + \sigma) \sin(\sigma_1 - \sigma_2) m - \beta \sin(\sigma - \sigma_1) + \\ + (m - 1) \sin i \cos i \sin(\sigma - \sigma_1) &= 0. \end{aligned} \quad (D)$$

Это уравненіе, разумѣется, тождественно<sup>1</sup> съ (C).

Изъ уравненія (C) находимъ:

$$\operatorname{tang} \sigma = - \frac{\left\{ \begin{array}{l} n_1 \sin i \sin(\sigma_1 - \sigma_2) + \beta \sin \sigma_2 - \\ - (m - 1) \sin i \cos i \sin \sigma_2 \end{array} \right\}}{\left\{ \begin{array}{l} n_1 \cos i \sin(\sigma_1 - \sigma_2) - \beta \cos \sigma_2 + \\ + (m - 1) \sin i \cos i \cos \sigma_2 \end{array} \right\}}. \quad (E)$$

Разовьемъ теперь это уравненіе.

Положимъ для краткости письма:

$$p_1 = \sin \sigma_1 \cos \sigma_1 + \sin^2 \sigma_1 \operatorname{tang} \tau_1, \quad p_2 = \sin \sigma_2 \cos \sigma_2 + \sin^2 \sigma_2 \operatorname{tang} \tau_2$$

$$q_1 = p_1 + \sin i \cos i, \quad q_2 = p_2 + \sin i \cos i$$

$$a = n_1 \sin(\sigma_1 - \sigma_2), \quad b = n_2 \sin(\sigma_1 - \sigma_2);$$

<sup>1</sup> Вслѣдствіе соотношеній между  $\sigma_1, \sigma_2, \theta_1, \theta_2, \tau_1$  и  $\tau_2$ , обусловливаемыхъ двойнымъ предомленіемъ.



тогда получимъ сначала

$$\beta = p_1 - m p_2,$$

а потомъ

$$\text{tang } \sigma = - \frac{a \sin i + q_1 \sin \sigma_2 - m q_2 \sin \sigma_2}{a \cos i - q_1 \cos \sigma_2 + m q_2 \cos \sigma_2}.$$

Если - бы пользовались уравненіемъ (D), то получили бы сначала

$$\text{tang } \sigma = - \frac{\left\{ \begin{array}{l} n_2 m \sin i \sin (\sigma_1 - \sigma_2) + \beta \sin \sigma_1 - \\ - (m - 1) \sin i \cos i \sin \sigma_1 \end{array} \right\}}{\left\{ \begin{array}{l} n_2 m \cos i \sin (\sigma_1 - \sigma_2) - \beta \cos \sigma_1 + \\ + (m - 1) \sin i \cos i \cos \sigma_1 \end{array} \right\}} \quad (F)$$

и потомъ

$$\text{tang } \sigma = - \frac{b \sin i + q_1 \sin \sigma_1 - m q_2 \sin \sigma_1}{b \cos i - q_1 \cos \sigma_1 + m q_2 \cos \sigma_1}.$$

Такъ-какъ  $m$  заключаетъ въ себѣ  $\sigma$ , то надо послѣднія выраженія для  $\text{tang } \sigma$  раскрыть и затѣмъ опредѣлить  $\sigma$ ; но этотъ пріемъ не удобенъ, ибо приводитъ къ большимъ сложности, поэтому мы будемъ дѣйствовать иначе.

Зная, что

$$\text{tang } \sigma = \frac{\sin \sigma}{\cos \sigma},$$

составимъ выраженія:

$$- \frac{\sin \sigma}{\cos \sigma} \cos \sigma_1 + \sin \sigma_1 = - \frac{\sin (\sigma - \sigma_1)}{\cos \sigma}$$

и

$$- \frac{\sin \sigma}{\cos \sigma} \cos \sigma_2 + \sin \sigma_2 = - \frac{\sin (\sigma - \sigma_2)}{\cos \sigma}.$$

По первой формулѣ для  $\text{tang } \sigma$  имѣемъ:

$$\frac{\sin (\sigma - \sigma_1)}{\cos \sigma} = \frac{a \sin (i + \sigma_1) - q_1 \sin (\sigma_1 - \sigma_2) + m q_2 \sin (\sigma_1 - \sigma_2)}{a \cos i - q_1 \cos \sigma_2 + m q_2 \cos \sigma_2},$$

$$\frac{\sin(\sigma - \sigma_2)}{\cos \sigma} = \frac{a \sin(i + \sigma_2)}{a \cos i - q_1 \cos \sigma_2 + m q_2 \cos \sigma_2}.$$

Раздѣляя одно изъ этихъ выраженій на другое и замѣчая, что

$$\frac{\sin(\sigma - \sigma_1)}{\sin(\sigma - \sigma_2)} = m \frac{n_2}{n_1},$$

найдемъ:

$$m \frac{n_2}{n_1} = \frac{a \sin(i + \sigma_1) - q_1 \sin(\sigma_1 - \sigma_2) + m q_2 \sin(\sigma_1 - \sigma_2)}{a \sin(i + \sigma_2)}$$

или, подставивъ значеніе  $a$  и сокративъ на общаго множителя:  $\sin(\sigma_1 - \sigma_2)$ , получимъ:

$$m \frac{n_2}{n_1} = \frac{n_1 \sin(i + \sigma_1) - q_1 + m q_2}{n_1 \sin(i + \sigma_2)}.$$

Отсюда

$$m = \frac{n_1 \sin(i + \sigma_1) - q_1}{n_2 \sin(i + \sigma_2) - q_2} \quad (G)$$

Это уравненіе весьма простаго вида, изъ него найдемъ  $\text{tang } \sigma$  въ функціи данныхъ и извѣстныхъ величинъ. Зная, что

$$m = \frac{n_1}{n_2} \frac{\cos \sigma_1 \text{ tang } \sigma - \sin \sigma_1}{\cos \sigma_2 \text{ tang } \sigma - \sin \sigma_2},$$

имѣемъ

$$\text{tang } \sigma = \frac{n_1 n_2 \sin i \sin(\sigma_1 - \sigma_2) + q_1 n_2 \sin \sigma_2 - q_2 n_1 \sin \sigma_1}{n_1 n_2 \cos i \sin(\sigma_1 - \sigma_2) - q_1 n_2 \cos \sigma_2 + q_2 n_1 \cos \sigma_1}. \quad (H)$$

Итакъ,  $\sigma$  найдено, хотя выраженіе для  $\text{tang } \sigma$  довольно сложно, но подстановка его значенія въ тѣ формулы, изъ коихъ опредѣляются другія неизвѣстныя, оказывается менѣе сложною вслѣдствіе многихъ сокращеній. Мы можемъ дать  $\text{tang } \sigma$  другой видъ, вводя значенія  $n_1$  и  $n_2$  и полагая для краткости:

$$\sin(\sigma_1 - \sigma_2) \operatorname{tang} \theta_1 \operatorname{tang} \theta_2 = P,$$

$$\sin i P = A, \quad \cos i P = A_1$$

$$q_1 \sin \sigma_2 \operatorname{tang} \theta_2 - q_2 \sin \sigma_1 \operatorname{tang} \theta_1 = B,$$

$$-q_1 \cos \sigma_2 \operatorname{tang} \theta_2 + q_2 \cos \sigma_1 \operatorname{tang} \theta_1 = B_1;$$

подставляя все это въ значеніе  $\operatorname{tang} \sigma$ , найдемъ:

$$\operatorname{tang} \sigma = - \frac{A \cos \theta + B \sin \theta}{A_1 \cos \theta + B_1 \sin \theta}.$$

§ 8.

Опредѣлимъ теперь  $\tau$ . Такъ-какъ во всеѣ формулы количество  $\sigma$  входитъ или одно или вмѣстѣ съ  $\tau$  и въ послѣднемъ случаѣ всегда въ видѣ выраженія

$$\sin \sigma \cos \sigma + \sin^2 \sigma \operatorname{tang} \tau,$$

поэтому вмѣсто  $\operatorname{tang} \tau$  опредѣлимъ количество

$$Q = \sin \sigma \cos \sigma + \sin^2 \sigma \operatorname{tang} \tau.$$

Пользуясь формулой (B), имѣемъ:

$$Q - \sin \sigma \cos \sigma = \frac{\lambda_1 \sin^2 \sigma - m \lambda_2 \sin^2 \sigma}{m - 1}.$$

Подставляя сюда значеніе  $m$  изъ формулы (G) и значеніе  $\lambda_1 \sin^2 \sigma$ ,  $\lambda_2 \sin^2 \sigma$  изъ формулъ § 7, найдемъ послѣ нѣкоторыхъ простыхъ и очевидныхъ упрощеній количество  $Q$ . Дѣйствительно, (сначала найдемъ:

$$Q = \frac{m p_2 - p_1}{m - 1},$$

а потомъ

$$Q = \frac{p_2 \{n_1 \sin(i + \sigma_1) - q_1\} - p_1 \{n_2 \sin(i + \sigma_2) - q_2\}}{n_1 \sin(i + \sigma_1) - n_2 \sin(i + \sigma_2) - q_1 + q_2}.$$

Полагая же:

$$p_2 \operatorname{tang} \theta_1 \sin(i + \sigma_1) - p_1 \operatorname{tang} \theta_2 \sin(i + \sigma_2) = C, p_1 q_2 - p_2 q_1 = D,$$

$$\operatorname{tang} \theta_1 \sin(i + \sigma_1) - \operatorname{tang} \theta_2 \sin(i + \sigma_2) = C_1, q_2 - q_1 = D_1,$$

имѣемъ:

$$Q = \frac{C \cos \theta + D \sin \theta}{C_1 \cos \theta + D_1 \sin \theta} \quad (K)$$

(1) § 9.

Найдемъ теперь  $h \sin \theta'$ ,  $h \cos \theta'$  и т. д.

Подставляя значеніе  $\operatorname{tang} \sigma$  въ выраженіе для  $h \sin \theta'$  и замѣтивъ, что

$$A_1 \sin i - A \cos i = 0,$$

найдемъ:

$$h \sin \theta' = \frac{B_1 \sin i + B \cos i}{B \cos i - B_1 \sin i} \sin \theta + \frac{A_1 \sin i + A \cos i}{B \cos i - B_1 \sin i} \cos \theta$$

или

$$h \sin \theta = h_1 \sin \theta + h'_1 \cos \theta, \quad (1)$$

гдѣ

$$h_1 = \frac{B \cos i + B_1 \sin i}{B \cos i - B_1 \sin i}, \quad h'_1 = \frac{A \cos i + A_1 \sin i}{B \cos i - B_1 \sin i}$$

Далѣе найдемъ подобнымъ же путемъ:

$$h \cos \theta' = h_2 \sin \theta + h'_2 \cos \theta, \quad (2)$$

гдѣ

$$h_2 = \frac{D - D_1 \sin i \cos i}{B \cos i - B_1 \sin i}, \quad h'_2 = \frac{C - C_1 \sin i \cos i}{B \cos i - B_1 \sin i}$$

Потомъ найдемъ:

$$g_1 \sin \theta_1 = k_1 \sin \theta + k'_1 \cos \theta, \quad (3)$$

гдѣ

$$k_1 = \frac{B \cos \sigma_2 + B_1 \sin \sigma_2}{B \cos i - B_1 \sin i} \cdot \frac{2 \sin \sigma_1 \cos i}{\sin(\sigma_1 - \sigma_2)},$$

$$k'_1 = \frac{A \cos \sigma_2 + A_1 \sin \sigma_2}{B \cos i - B_1 \sin i} \cdot \frac{2 \sin \sigma_1 \cos i}{\sin(\sigma_1 - \sigma_2)}.$$

Такъ-же найдемъ:

$$g_2 \sin \theta_2 = k_2 \sin \theta + k'_2 \cos \theta, \quad (4)$$

гдѣ

$$k_2 = - \frac{B \cos \sigma_1 + B_1 \sin \sigma_1}{B \cos i - B_1 \sin i} \cdot \frac{2 \sin \sigma_2 \cos i}{\sin(\sigma_1 - \sigma_2)},$$

$$k'_2 = - \frac{A \cos \sigma_1 + A_1 \sin \sigma_1}{B \cos i - B_1 \sin i} \cdot \frac{2 \sin \sigma_2 \cos i}{\sin(\sigma_1 - \sigma_2)}.$$

Наконецъ найдемъ:

$$g_1 \cos \theta_1 = l_1 \sin \theta + l'_1 \cos \theta \quad (5)$$

$$g_2 \cos \theta_2 = l_2 \sin \theta + l'_2 \cos \theta, \quad (6)$$

гдѣ

$$l_1 = - \frac{2 \sin \sigma_1 \cos i}{\alpha} \cdot \frac{D - D_1 p_2}{B \cos i - B_1 \sin i},$$

$$l'_1 = - \frac{C - C_1 p_2}{B \cos i - B_1 \sin i} \cdot \frac{2 \sin \sigma_1 \cos i}{\alpha}.$$

$$l_2 = \frac{2 \sin \sigma_2 \cos i}{\alpha} \cdot \frac{D - D_1 p_1}{B \cos i - B_1 \sin i},$$

$$l'_2 = \frac{C - C_1 p_1}{B \cos i - B_1 \sin i} \cdot \frac{2 \sin \sigma_2 \cos i}{\alpha}.$$

Такимъ образомъ задача рѣшена.

§ 10.

Въ заключеніе покажемъ выводъ нѣкоторыхъ слѣдствій, найденныхъ Макъ-Куллохомъ.

Умножая (1) уравненіе предыдущаго параграфа на  $\cos \delta$ , а (2) на  $-\sin \delta$ ; а потомъ на  $\sin \delta$  и  $\cos \delta$  по сложении результатовъ, найдемъ:

$$h \sin (\theta' - \delta) = (h_1 \cos \delta - h_2 \sin \delta) \sin \theta + (h'_1 \cos \delta - h'_2 \sin \delta) \cos \theta$$

$$h \cos (\theta' - \delta) = (h_1 \sin \delta + h_2 \cos \delta) \sin \theta + (h'_1 \sin \delta + h'_2 \cos \delta) \cos \theta,$$

при этомъ  $\delta$  есть какой-нибудь уголъ.

Если желаемъ, чтобы отраженный лучъ былъ поляризованъ въ плоскости, азимутъ которой есть  $\delta$ , то необходимое и достаточное для этого условіе будетъ:

$$h \cos (\theta' - \delta) = 0.$$

Такъ-какъ это равенство должно существовать при всякомъ  $\theta$ , то заключаемъ, что необходимо, чтобы

$$h_1 \sin \delta + h_2 \cos \delta = 0$$

$$h'_1 \cos \delta + h'_2 \sin \delta = 0.$$

Откуда:

$$\operatorname{tang} \delta = -\frac{h_2}{h_1} = -\frac{h'_2}{h'_1}. \quad (1)$$

Для опредѣленія угла паденія  $i$ , при которомъ существуетъ полная поляризація въ азимутѣ  $\delta$ , имѣемъ уравненіе:

$$h_1 h'_2 + h'_1 h_2 = 0. \quad (2)$$

Изъ тѣхъ же формулъ § 9, находимъ:

$$\operatorname{tang} \theta' = \frac{h'_1 + h_1 \operatorname{tang} \theta}{h'_2 + h'_2 \operatorname{tang} \theta}.$$

Для максимум'а отклоненія плоскости поляризаціи отраженнаго луча необходимое условіе:

$$\frac{d\theta'}{d\theta} = 0$$

даетъ:

$$h_1 h'_2 - h'_1 h_2 = 0. \quad (3)$$

Слѣдовательно, наибольшее отклоненіе (плоскости поляризаціи) отраженнаго луча опредѣлится изъ уравненія:

$$\text{tang } \eta = \frac{h_1}{h_2} = \frac{h'_1}{h'_2}, \quad (4)$$

если буквою  $\eta$  назовемъ это отклоненіе.

Сравнивая эту формулу съ (1), находимъ:

$$\text{tang } \delta \text{ tang } \eta = -1.$$

Это равенство представляетъ извѣстную теорему, найденную Макъ-Куллохомъ.

Подобнымъ же образомъ можемъ вывести и другія любопытныя свойства отраженныхъ или преломленныхъ лучей относительно ихъ поляризаціи; но это выходитъ изъ предѣловъ назначенныхъ нами для этой замѣтки; прибавимъ только, что предварительныя выраженія для неизвѣстныхъ вопроса въ функціи отъ  $\sigma$ ,  $\tau$ ,  $\rho$  и  $\mu$  (§§ 2—6) очень удобны для вывода и изслѣдованія различнаго рода соотношеній, существующихъ между ними.

(2)

$$0 = h_1 h'_2 + h'_1 h_2$$

$$\text{tang } \delta = \frac{h'_1 + h_2 \text{ tang } \delta}{h_1 + h'_2 \text{ tang } \delta}$$